ЗАДАЧА О СКОЛЬЖЕНИИ ТЕЛА ПО ГЛАДКОЙ ГОРКЕ ЗАДАННОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Высота и длина горки

$$H0 := 5 \quad L0 := 4 \quad \kappa := \frac{H0}{L0}$$

Для сравнения выбираются две кривые, описывающие форму горки - парабола и циклоида (брахистрохона)

Уравнение параболы: $n := 2$

$$\phi(x) := \frac{Hl}{n} \cdot \left[n - \frac{x}{Ll} - (n-1) \left(\frac{x}{Ll} \right)^2 \right] \quad \phi l(x) := \frac{d}{dx} \phi(x)$$

Уравнение циклоиды:

$$X(u) := Cl \cdot (u - \sin(u)) \quad Y(u) := Hl - Cl \cdot (1 - \cos(u))$$

Связь параметра циклоиды и времени:

$$u(t) := \sqrt{\frac{g}{Cl}} \cdot t$$

$$0 \leq u \leq u_1$$

$$Cl = 3.405 \text{ m}$$

$$u_1 = 2.058$$

Общее время спуска по циклоиде:

$$T1 := u_1 \cdot \sqrt{\frac{Cl}{g}}$$

$$T1 = 1.213 \text{ s}$$

Общее время спуска по параболе

$$T2 := \frac{1}{\sqrt{2g}} \cdot \int_0^{Ll} \sqrt{\frac{1 + \phi l(x)^2}{Hl - \phi(x)}} dx$$

$$T2 = 1.447 \text{ s}$$

Решаем дифференциальное уравнение для движения точки на параболe:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \sqrt{2g \frac{H - y(x)}{1 + y'^2(x)}} \quad \xi(t) = 1 - \frac{x(t)}{L} \quad t = T2 \cdot \left(1 - \frac{\tau}{\tau0}\right)$$

$N0 := 1000$

Число расчетных точек на интервале от 0 до $T2$.

$$\tau0 := T2 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot H1}{L1^2}}$$

Безразмерное обратное время τ от 0 до $\tau0$.

$\tau0 = 3.582$

Интегрируем уравнения движения.

Given

$$\frac{d}{d\tau} \xi(\tau) = \sqrt{\frac{1 - \xi(\tau) + (n - 1) \cdot (1 - \xi(\tau))^2}{n + \frac{\kappa^2}{n} [1 + 2 \cdot (n - 1) (1 - \xi(\tau))]^2}} \quad \xi(0) = 0$$

$\xi := \text{Odesolve}(\tau, 3.52896, N0)$

Законы движения точек по параболe и брахистохроне:

$$x(t) := L1 \cdot \left[1 - \xi \left[\tau0 \cdot \left(1 - \frac{t}{T2} \right) \right] \right]$$

$$y(t) := \phi(x(t))$$

$$xB(t) = C1 \cdot (u(t) - \sin u(t))$$

$$yB(t) = H1 - C1 \cdot (1 - \cos u(t))$$

Моделирования движения (замедление в 4 раза):

Скорость видео-потока (кадры/секунду)

$$Vrate := 10 \cdot \frac{1}{s}$$

$$kT := 4$$

Текущее время (с):

$$t := \frac{FRAME + 0.9}{kT \cdot Vrate}$$

Число видеокадров:

$$NF = 56$$

ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛЕ И БРАХИСТОХРОНЕ В ПОЛЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ (замедление в 4 раза):

Текущее время (с)

$$t = 0.023 \text{ s}$$

Декартовы координаты тел (м)

$$x(t) = 0 \text{ m}$$

$$y(t) = 5 \text{ m}$$

Точка на параболе:

Точка на брахистохроне:

$$xB(t) = 0 \text{ m}$$

$$yB(t) = 5 \text{ m}$$

$$C0 := \sqrt{\frac{H0^2 + L0^2}{2}} \quad u0 := \frac{\pi}{2} \quad \text{Given}$$

$$C0 \cdot (u0 - \sin(u0)) = L0 \quad C0 \cdot (1 - \cos(u0)) = H0$$

$$PAR := \text{Find}(C0, u0)$$

$$C1 := PAR_0 \cdot m \quad u1 := PAR_1 \quad \underline{H1} := H0 \cdot m \quad L1 := L0 \cdot m$$

$$C1 \cdot (u1 - \sin(u1)) = 4 \text{ m}$$

$$C1 \cdot (1 - \cos(u1)) = 5 \text{ m}$$

$$xB(t) := \begin{cases} Cl \cdot (u(t) - \sin(u(t))) & \text{if } t \leq T1 \\ L1 & \text{if } t > T1 \end{cases}$$

$$yB(t) := \begin{cases} H1 - Cl \cdot (1 - \cos(u(t))) & \text{if } t \leq T1 \\ 0 & \text{if } t > T1 \end{cases}$$

Рисуем горку:

$$N1 := 100 \quad i := 2..N1 \quad t1_i := \frac{T2}{N1} \cdot i$$

$$xp_i := x(t1_i) \quad yp_i := y(t1_i)$$

Рисуем брахистохрону:

$$N2 := 100 \quad j := 0..N2 \quad u2_j := \frac{u1}{N2} \cdot j$$

$$xb_j := X(u2_j)$$

$$yb_j := Y(u2_j)$$

Вычисляемые параметры движения:

$$NF := kT \cdot trunc(Vrate \cdot T2)$$